

achevé de lire 1°

de 21 mas

1778.

N^o 7^{xx}
Mémoire sur les principaux vices de Conformation du Bassin
considérés relativement à l'Accouchement.



Par M. Baudeloque

Ce Mémoire est divisé en trois Sections: la première traite des vices de conformation, qui en font le sujet, de leurs caractères et de la manière de les reconnoître; la 2^{me} de leurs effets relativement à l'accouchement, et la 3^{me} est une espèce d'analyse des différentes méthodes proposées pour terminer ce dernier, dans tous les cas.

Première Section

§ I La nature n'est pas plus constante dans les Proportions du Bassin de la femme que dans l'écoulement de ses productions. Cette cavité n'est jamais exactement semblable dans plusieurs individus. Sa forme et ses dimensions varient à l'infini, et présentent autant de nuances que les traits du visage. Si l'œil du Physicien ne découvre dans la variété de ces derniers qu'un sujet d'étonnement et d'admiration, il n'en est pas de même à l'égard du Bassin, qui s'éloigne trop de la règle commune; souvent il n'apperoit de ce côté qu'une source d'infortunes pour l'amère et l'enfant qui doit naître. Car l'un et l'autre n'échappent alors aux écueils de la grossesse que pour se voir bientôt exposés à des accidens mille fois plus fâcheux, et à la mort même. L'accouchement, cette fonction si naturelle et si simple par laquelle nous passons, pour ainsi dire, du néant à la vie, ne peut en effet s'opérer sans danger, qu'il n'existe un rapport favorable entre cette partie de la mère et la tête de l'enfant: quand ce rapport ne se rencontre pas, il devient difficile, laborieux, et quelques fois impossible sans des secours ^{+ qui inspirent} de terribles, au Praticien même qui se voit dans la triste nécessité de les administrer.



§ II

Nous rapporterons à deux chefs principaux les différents états du Bassin qui peuvent troubler l'ordre naturel de l'accouchement, savoir à l'excès, et au défaut de grandeur. mais entre ces deux extrêmes on peut observer des degrés infinis, dont nous ne marquerons que les plus apparents. ceux qui tiennent le milieu, caractérisent le Bassin le plus ordinaire, tandis que les autres produisent des effets plus ou moins fâcheux selon qu'ils se rapprochent d'un extrême ou de l'autre et que le vice duquel ils participent affecte plusieurs parties de cette cavité en même tems ou une seule.

§ III

Lachûte de la Matrice dans le commencement de la grossesse, quelque fois même dans le tems de l'accouchement, son extrême obliquité, les effets de celle-ci &c. sont les suites de l'excès de l'argueur du Bassin. Les moyens de les prévenir ou d'y remédier sont si simples et en outre si connus ^{monde.} de tous le monde que nous passerons cet objet sous silence, pour ne nous occuper que de l'excès contraire c'est à dire du défaut de grandeur, qui paroît offrir un champ déjà trop vaste pour les bornes d'un Mémoire.

§ IV

Mais avant d'entrer dans les détails relatifs à ce vice de conformation, nous nous croyons indispensablement obligé d'exposer, au moins très succinctement, le rapport naturel du Bassin de la femme et de celui de l'enfant. Il est impossible dans un mémoire de ne pas dire un mot de certaines choses déjà connues, lorsqu'elles y sont tellement liées qu'elles en forment comme la trame. d'ailleurs elles y sont toujours nécessaires pour l'enchaînement et la comparaison des idées. Je ne me flatte pas d'en donner ici que du nouveau: Je prévius au contraire que le mémoire en contenant peu, et que je n'ai fait que rassembler, en quelque sorte, des choses éparses, jetées sans ordre dans les auteurs et le plus souvent avec obscurité, pour en faire un tout qui puisse les présenter dans un jour plus favorable. Si l'Académie ne trouve pas ce travail digne de son attention je desire qu'elle y reconnoisse au moins le zèle qui me l'a fait entreprendre.

§ V.

On divise le Bassin communément en deux parties, dont l'une en forme comme le bord, et l'autre la cavité. Tous les accoucheurs reconnoissent à celle

des deux

deux détroits et une excavation. Le détroit supérieur, qui en est comme l'entrée, a une figure presque elliptique. Si on le considère dans le Bassin Sec et décharné. Son diamètre transversal a cinq pouces et un quart ou environ et celui de devant en arrière quatre pouces et quelques lignes. Les parties molles y apportent peu de différence. Le contour du détroit inférieur n'est pas aussi régulier que celui du premier et offre un peu moins d'étendue. on assigne son petit diamètre d'un ischion à l'autre, Quoique le plus souvent on observe le contraire: il est vrai que celui qui le croise à angle droit pour s'augmenter un peu par la retro-pulsion du cœcix. Ce détroit, complété postérieurement et de chaque côté par deux bandes ligamenteuses présente en devant une échancrure en forme d'Arcade, qu'on nomme Arcade du Pubis, dont la largeur ordinaire vers la base est d'environ trois pouces, pour l'ordinaire, et de dix huit à vingt lignes vers le Sommet. La partie moyenne, ou excavation, a un peu plus de largeur que les détroits, ce qui dépend surtout de la courbure du Sacrum. Sa hauteur, postérieurement est de quatre pouces et demi à cinq pouces, de trois et demi latéralement, et rarement au-delà de dix huit lignes en devant.

§ VI. De toutes les parties de l'enfant la tête étant celle qui trouve le plus d'obstacles dans l'accouchement, il suffit d'en connaître les dimensions pour le but que nous nous proposons. Sa figure tient plutôt de l'ovale que de tout autre; elle est aplatie dans différents sens. on peut y remarquer quatre diamètres dont le plus grand est de cinq pouces, et souvent plus; le moyen de quatre pouces jusqu'à quatre pouces et demi; et les deux autres de trois et demi ou environ. Le 1^{er} va du menton au haut de l'occiput, en traversant la tête obliquement. Le 2^e du milieu du front au même endroit, ~~de la base du nez~~ de la base du nez, le 3^e d'une protubérance pariétale à l'autre, et le 4^e du Sommet à la base du crâne.

§ VII. D'après ce qui vient d'être exposé, on voit que les dimensions du Bassin sont un peu plus grandes que celles de la tête du fœtus. Si on fait attention et d'ailleurs à la manière dont celle-ci s'avance dans l'accouchement on ne pourra s'empêcher de convenir que cette partie de la femme n'offre un peu plus d'espace qu'il n'en faut strictement pour son passage. En conséquence le Bassin peut être un peu plus petit qu'à l'ordinaire sans être vicié, et sans apporter d'obstacles à la naissance de l'enfant. Il ne convient de lui donner ce nom que lors qu'un de ses diamètres, ou plusieurs, est plus petit que les deux derniers de la tête assignés au Paragraphe précédent. Dans ce cas on dit communément qu'il est trop étroit.

§ VIII. Nous distinguerons deux espèces d'étroitesse dans le Bassin.



l'une absolue et l'autre relative. Dans la 1^{re} la disproportion tient à la construction même de cette Partie; dans la 2^{me} elle vient au contraire de l'état ^{de la partie} ~~pathologique~~ ^{de la partie} de l'état de l'enfant, de son volume contre nature. De celle-ci est en général bien moins fâcheuse que l'autre. Elle peut se rencontrer dans une femme qui a déjà accouché très naturellement. Et qui pourra le faire de même dans la suite; il n'en est pas ainsi de la première, elle ne s'efface jamais; ses effets ^{tojours} ~~plus~~ ^{plus} fâcheux, sont les mêmes, à peu de chose près, dans tous les accouchements. Elle peut affecter indistinctement toutes les Parties du Bassin: mais elle les attaque rarement d'ensemble. On voit même assez souvent qu'un détroit est plus grand que de coutume quand l'autre est plus serré. ~~Quand~~ ^{Quand} qu'elle existe dans le détroit supérieur c'est communément de devant en arrière, quelques fois d'un seul côté, et presque jamais transversalement. Il n'en est pas de même dans le détroit inférieur, ce vice y est bien plus fréquent d'un côté à l'autre que dans toute autre direction. nous réduisons les différents degrés de ce vice à cinq principaux.

S. IX. Dans le premier nous fixerons le plus petit diamètre du Bassin, soit du détroit supérieur, soit de l'inférieur, à trois pouces et demi d'étendue: la tête d'un enfant de volume ordinaire n'ayant que cette épaisseur peut passer dans le cas sans changer de forme. L'accouchement, il est vrai, sera un peu plus long que si le Bassin avoit toute sa largeur ordinaire, parce qu'il y aura plus de frottement.

S. X. Dans le 2^{me} degré le petit diamètre dont il s'agit n'a que trois pouces. La tête ne peut traverser le Bassin qu'en s'imoulant en quelque sorte: elle s'allonge pour l'ordinaire d'abord à la fontanelle postérieure, ou à la jonction de la suture sagittale et l'ambdoïde, et elle s'applatit sur les côtés. L'accouchement se fait encore naturellement, ou peut se faire dans ce cas. j'en ai vu un assez grand nombre, parce que ce degré d'étroitesse n'est pas rare dans le détroit supérieur. mais la violence et la longueur du travail sont toujours proportionnées à la solidité des os du crâne, qui rend les changements dont nous venons de parler plus ou moins difficiles.

S. XI. Dans le 3^{me} degré le petit diamètre du Bassin n'a que trois pouces moins un quart. L'accouchement est encore possible par cette voie; mais il sera toujours très long, et exigera le plus souvent les secours de l'art. Je citerai cependant deux exemples du contraire, même dans des femmes dont le Bassin paroissoit un peu plus resserré dans le détroit supérieur: puisque le petit diamètre fut jugé n'avoir que deux pouces et demi. Mais on ne doit regarder ces exemples que comme des exceptions heureuses ~~de la règle~~, qui prouvent seulement combien la Nature à le droit de nous surprendre. Combien elle a des moyens pour prévenir les suites fâcheuses de ses écarts, et parvenir à son but. Les deux femmes, qui en furent le sujet, étoient des plus contrefaites; l'une d'elles qui d'elles étoit disposée de longue main à l'opération césarienne, elle accoucha avec une si grande facilité qu'on eut à peine besoin de s'en occuper après. Pour lui donner les soins.

observ.
1^{re} et 11^{me}.

obs.
2.

Soins ordinaires. M^{re} Solairé, qu'elle avoit choisi pour cela, surpris de la figure de l'enfant de l'enfant en prêt les dimensions; et j'en ai souvent entendu dire que la longueur de cette tête depuis le milieu du menton jusqu'au haut de l'occiput étoit de sept pouces et demi et sa plus grande épaisseur de deux et demi au plus. La 2^e femme accoucha dans mes cours vers la fin de 1773. Son travail ne dura qu'environ trois heures, et ne fut pas des plus violents. La tête de l'enfant s'allongea comme celle du précédent. elle avoit sept pouces de longueur, et 2. pouces et demi d'épaisseur. Plus de 25. élèves en ont été témoins. Les deux enfans, d'un volume ordinaire, vinrent très vivans. Les os du crâne étoient souples comme un carton de moyenne épaisseur, et la tête, de l'un et de l'autre, étoit si molle qu'on osoit à peine la toucher. avec la simple précaution de tenir les enfans couchés sur le dos, leur tête reprit sa forme ordinaire. Ces deux observations paroissent peut être n'être sorties que de la plume de l'écrivain. Si depuis l'un d'académie n'est en sous les yeux un bassin qui n'avoit pas plus de largeur dans sa partie supérieure, que celle qu'on avoit assignée à ceux dont il s'agit. Ce peut comme le remarque le chirurgien qui la envoya, la femme avoit plusieurs enfans vivans, restans du nombre qu'elle avoit eu.

De cinq

observ. iii.

Et quel est leur récit

* Il paraît que
173. p. 1. de l'ouvrage de
Ces de l'académie de l'art
jus qu'à l'année de l'académie

J'en rapporterai qu'un troisième exemple à l'appuy de ces premiers. Je le paraitra peut être d'autant plus à propos, qu'on a mis après, et marchandé en quelque sorte, la confiance de l'enfant qui en fait le sujet, pour la livrer à l'auteur de la section du Pubis, opération de laquelle on parle encore aujourd'hui avec tant d'emphasis. Cette femme haute de trois pieds neuf pouces, d'une constitution bien plus délicate que la femme Touchet, et beaucoup plus contre faite de tronc et des hanches, accoucha très naturellement le vingt deux mars dernier d'un enfant vivant, qu'elle nourrit aujourd'hui. Son travail fut violent pendant dix heures. La tête en employa près de huit à traverser le détroit supérieur, pendant lesquelles, les os parietaux et occipital traversèrent les uns sur les autres au delà de plusieurs lignes, et il survint un enflurement si considérable au deris cervical qu'on ne pouvoit qu'à peine distinguer les fontanelles. Mon frere, et M^{re} de Long Mathes des comptes, livre depuis plus de deux ans, par goût, et par des vues de bienfaisance, à l'étude de plusieurs branches de l'art de guérir, et surtout à celle des accouchemens, qui avoit déjà fourni aux besoins de cette malheureuse pendant les derniers tems de sa grossesse, comme j'en ai vu faire à un très grand nombre d'autres, lui donneront des secours pendant mon absence, de sorte qu'au moment où j'allai me rendre chez elle la tête de l'enfant étoit presque sortie de la vulve. J'en mesurai la longueur, que je trouvais de cinq pouces 8. lignes entre les deux points indiqués au paragraphe précédent, de quatre pouces six lignes du milieu du front à l'occiput, tandis qu'elle n'avoit que trois pouces moins une ligne d'épaisseur d'un côté à l'autre. Les sutures et les fontanelles étoient très larges. Ce qui peut tout au moins faire présumer, que l'épaisseur indiquée précédemment a pu diminuer de trois à quatre lignes de plus que ce qu'elle étoit alors. 18. heures après l'accouchement cette dimension étoit augmentée au delà de deux lignes la première longueur étoit diminuée de dix lignes et celle du front à l'occiput de cinq. L'un de ces deux témoignages de sortie nous confirme le jugement que nous avions porté plus d'un mois avant sur l'état du bassin. Nous avions estimé que le petit diamètre du détroit supérieur n'étoit que de trois pouces moins un quart. on verra par la suite quelles règles nous suivons pour cela.



- (1)* cette femme nous étoit qu'on lui avoit fait proposer douze louis pour aller accoucher chez un médecin qui avoit inventé une nouvelle méthode d'accoucher les femmes contre faites, ou bien huit louis si elle ne vouloit pas sortir de chez elle.
- (2) Cet enfant a été étouffé comme les autres de sa mère le 8. ou le 9. jours de sa naissance.

S. XII. Dans le quatrième degré d'étroitesse du Bassin son Petit Diamètre n'a que 7 p. pouces et demi d'étendue. il n'est pas encore absolument impossible dans ce cas d'y faire passer un enfant terme et d'un volume ordinaire. Mais cela ne peut s'opérer ^{alors} que par les secours de l'Art, et les moyens nécessaires sous si dangereux pour l'enfant qu'on ne doit jamais s'y flatter de l'amener vivant. S'il ne s'agissoit que de l'extraire du sein de sa mère, il ne faudroit les mettre en parallèle avec aucun autre, mais comme ces points assés, qu'il faut s'efforcer d'éviter pour sauver la vie l'opération Césarienne paroît ~~être~~ ^{être} plus évidente. Je citerai quatre femmes que j'ai accouchées, desquelles le Bassin n'a paru vicié à ce degré dans les trois premiers. L'inférieur étoit des plus larges. j'en ai délivré deux sans le secours d'aucun instrument, et sur les autres, j'ai fait usage de forceps après avoir dégagé le tronc et les bras.

obs. IV.

L'une des deux premières femmes portoit son 1^{er} enfant: elle étoit en travail de plus de quarante heures, et le corps étoit depuis ce temps entièrement purgé. ~~La tête~~ ^{La tête} se presentoit dans une position transversale. Mr. Braillet avoit essayé déjà plusieurs fois de la prendre avec le forceps, mais elle s'en étoit toujours échappée, parce qu'elle n'étoit nullement engagée dans le Bassin. Je fus prendre les pieds de cet enfant et l'amener de cette manière, sans rencontrer de bien grande difficulté. il étoit d'un volume ordinaire, mais la tête, semblable à celle des enfans dont j'ai parlé dans les exemples précédents se faisoit à la moindre pression, tant que la mort existante au moins depuis l'entrée contribuoit un peu à sa mollesse extrême.

obs. V.

Je délivrai la 2^e le 5 de février dernier n'étant aidé que de mon forceps, par le refus qu'on avoit fait des manœuvres que j'avois proposées. Cette femme portoit son 4^e enfant. Les trois premiers furent amenés par les pieds. on ouvrit le crâne à deux - on décapita le 2^e et ce ne fut qu'environ dix huit heures après, qu'on le recouvra au même expédient pour retirer la tête de la matrice. Si le sort du 4^e n'eût pas été bien différent, puisqu'il a péri dans l'accouchement, au moins l'avons nous conservé entier. il presentoit les fesses le dos tourné vers le côté droit de sa mère - il mourut par la forte pression que ^{la tête} éprouva en traversant la filière du Bassin, après avoir éprouvé trois ou quatre convulsions violentes. La tête ne passa le même étroit qu'avec beaucoup de peine et ne l'auroit jamais fait, si je n'avois, si le Parietal gauche qui repose sur la paroi de la mère ne se fut fracturé en étoile, ce qui donna lieu à l'affaiblissement de cette partie. Cet enfant étoit des plus volumineux, sa longueur de 26 p. pouces, la largeur des épaules de 5 p. 10 l. - L'épaisseur de la poitrine de 4 p. la longueur de la tête de 5 p. 4 l. - la largeur de la menton à l'occiput, celle du front au même point 4 p. 6 l. et son épaisseur d'une bosse parietale à l'autre, les fragments d'os relevés, de trois p. 7 à 8 l. - mais dans le moment de l'accouchement de 2 p. 7 l. - seulement.

obs. VI. et VII.

Dans les deux autres femmes que j'ai annoncées. je me servis de forceps pour extraire la tête, après avoir dégagé le tronc et les bras. L'une ^{dans} sortit avec assez de facilité parce qu'elle étoit molle, et l'autre très difficilement, quoiqu'elle fût d'un volume égal. un des Parietals de celle-ci se fractura comme dans l'observation ci-dessus. Comme les deux enfans étoient morts - avant d'égager leur tête du sinus de l'instrument, j'examinai à quelle épaisseur elles étoient réduites l'une et l'autre, et je ne trouvais que deux p. 8 l. - et 8 l. - j'ai cru devoir rapporter ici ces différentes observations pour faire connaître le fruit des différentes méthodes que nous avons employées, lors que le Bassin est aussi serré. on verra dans la suite -

La suite de ce mémoire se qu'on doit penser de celui qu'on auroit pu y substituer.

S. XIII. Dans le Cinquième Degré d'étroitesse, le Bassin, encore plus serré que dans le précédent ne peut permettre l'entrée d'une main de grandeur ordinaire. Le Degré qui n'est pas absolument rare présente lui-même plusieurs nuances. j'ai dans ma collection deux Bassins dont l'un n'a que deux pouces 4-lignes de Petit Diamètre dans son entrée, et l'autre trois à 14-lignes. Le Docteur Hunter, sur ce qu'on m'a dit, en a vu un plus étroit que le dernier; celui d'une femme à qui le célèbre Camper a fait de puis peu l'opération césarienne n'offroit pas un Pouce de vide dans le même sens, et j'ai appris que dans un cas semblable la même opération avoit été pratiquée à Mont-pellier il y a quelques années. La citation de ces exemples ne peut être étrangère au sujet que j' traite ici.

S. XIV. Il est infiniment rare de rencontrer la Partie moyenne du Petit Bassin, qu'on appelle communément excavation, moins large que les Detroits. On l'a vu rarement ne peut avoir lieu pour cause qu'une courbure à contre sens du Sacrum, ou quelque exostose. Smellie dit qu'il les présente en dedans une grosse protubérance, au lieu d'une concavité. La courbure dont il s'agit peut manquer entièrement sans que la longueur et la largeur naturelle du Sacrum soient changées j'ai eu longtemps un Bassin dans lequel on voyoit une Parallele de position, laquelle donnoit à la cavité une figure Conique. Pour le Detroit Supérieur formoit la base et l'inférieur la pointe. Le P.^{er} ayant quatre Ponces et demi de diamètre antero-postérieur et ce dernier trois ponces moins un quart seulement, les deux dernières Pièces Pelvées étoient enlevées. on verra au Paragraphe 33. Les effets de cette conformation. Cette déviation est bien plus rare, que l'excès de la courbure, et ce dernier est d'autant plus facile, qu'il diminue toujours la hauteur du Petit Bassin postérieurement, il influe sur les autres parties et retient ordinairement la largeur des Detroits de devant en arrière.

S. XV. Outre tout ce qui vient d'être exposé la Cascade du Pabid est quelquefois trop basse ou trop étroite, et les épines ischiatiques peuvent être trop longues et déviées en même temps vers le centre du Bassin, ce qui aux vices de la première ils sont toujours une suite de quelques uns des précédens et les uns et les autres produisent les mêmes effets.



S. XVI. Le Rachitisme est ordinairement la cause première de la mauvaise conformation du Bassin. Quant aux différences ou aux nuances qu'elle présente elle viennent de la figure des os, de leur grandeur, de leur situation ou du vice de leur jonction. on peut attribuer les unes à l'action des muscles sur cette partie, les autres à la pression que les gorges de la part des vêtements, de la pression du corps, ou des bras de la Personne qui prend soin de l'enfant. C'est surtout à cette dernière cause que quelques auteurs les rapportent puis qu'ils avancent que le Bassin se déforme rarement dans les enfans qui peuvent se passer des bras de leur gouvernante, quand le rachitisme ~~se développe~~ ^{commence} après l'âge de deux ans.

S. XVII. A l'égard des exostoses qui peuvent aussi diminuer l'Étendue naturelle du Petit Bassin, tout le monde sçait qu'elles siègent indistinctement sur tous les points de cette cavité, et qu'elles parviennent à un volume plus ou moins considérable.

S. XVIII. Les Parties molles qui ont rapport au Bassin dérobent toujours à nos yeux la plus part de ses difformités et ne nous en laissent appercevoir que les plus apparentes. mais il est si difficile de juger de leur influence sur l'intérieur de cette cavité qu'il faut

déjà beaucoup d'expérience en cela pour ne pas se tromper. Presque tous les accouchés ont parlé des vices de conformation du Bassin & aucun jusqu'ici n'a donné de Bruytes assez lumineuses pour les découvrir. Puzos même qui a si souvent les bornes du Toucher n'en a presque rien après s'être reproché, en quelque sorte, d'avoir indiqué dans ses vides la manière de Procéder dans l'examen du Bassin; il se contente d'indiquer dans son excellent ouvrage qu'on ne doit point marier les filles bossues et contrefaites, parce qu'elles ne peuvent, selon lui, donner à la société que des hommes infirmes & le plus souvent incapables d'en remplir les devoirs. Chaque jour fournit des preuves du contraire, et elles n'ont point échappé à cet auteur puisqu'il en cite plusieurs. Nous voyons souvent ces sortes de femmes accoucher avec facilité, et leurs enfans naître avec les dispositions nécessaires pour devenir des hommes forts & vigoureux.

S. XIX. L'inspection de l'épine et des extrémités inférieures, la hauteur et la demeure de la femme, ne peuvent jeter qu'une faible clarté sur le fond du Bassin. Si la difformité des premières est le plus souvent accompagnée de celle de ce dernier. Quelques fois aussi on le trouve assez grand dans ces femmes, tandis que dans d'autres qui sont bien faites d'ailleurs, il cache des obstacles plus ou moins funestes à la sortie de l'enfant.

S. XX. Pour acquiescer, autant qu'il est possible, la connoissance de l'intérieur du bassin il n'est pas inutile d'en considérer le dehors. Chaque vice dont nous avons parlé a un caractère extérieur qui peut nous mettre dans la voie de le découvrir. Je fais faire attention à la grandeur, et à la figure des os; examiner si elles sont selon l'ordre naturel, évaluer leur épaisseur par celles des os des extrémités, et se rappeler laquelle est dans une femme de stature ordinaire. J'ai observé qu'elle varioit peu et qu'elle étoit à une ou deux lignes près la même dans tous les sujets de cette classe. On doit aussi estimer celle des parties molles qui recouvrent ces os et la tapissent intérieurement. Elle est plus grande ou plus petite selon l'embonpoint. Ces choses bien observées, il n'est pas impossible de trouver, à peu de chose près, l'étendue du diamètre du Bassin qui est vicié le plus souvent et qu'il importe le plus de connoître, celle du diamètre du détroit supérieur qui va du haut du Sacrum au Pubis.

S. XXI. Pour cela on prend la longueur de ce diamètre continué à travers la symphyse du pubis, le haut du Sacrum les muscles les graisses et les tegumens, ou ce qui est le même, l'épaisseur de la femme depuis le milieu du Mout de Venus jusqu'à la chaire des reins, aux environs de l'épine de la 1^{re} femme vertèbre du Sacrum. On dit de cette épaisseur, 2-pouces $\frac{1}{2}$ ou environ pour celle de la Base du Sacrum, 7-à 8-lignes pour celle de la Symphyse du Pubis, et plus ou moins pour les graisses les tegumens et les autres parties molles qui sont dans la même direction, et le reste nous fait connoître l'étendue du Bassin dans ce sens.

S. XXII. Ce n'est qu'après avoir vérifié ces mesures par l'ouverture d'un certain nombre de Cadavres que j'ai l'honneur de les proposer. Très rarement j'ai trouvé plusieurs lignes d'erreur dans l'estimation que j'en avois faite de cette manière. Sur la plus part des femmes qui étoient maigres l'épaisseur du Bassin dans le haut indiquée ci-dessus n'étoit que de sept pouces ou sept pouces et demi, et de huit à neuf chez celles qui avoient beaucoup d'embonpoint. Dans toutes les petites diamètres du détroit supérieur étoit de quatre pouces une ou deux lignes. Dans une femme sur laquelle l'épaisseur dont il s'agit n'étoit que sept pouces, le même diamètre n'étoit que de trois pouces neuf lignes. Dans plusieurs autres dont la même épaisseur n'étoit que de six pouces et quelques lignes, la longueur du dernier n'alloit pas au-delà de trois pouces. J'en ai point encore eu l'occasion

en l'occasion de M^{re}ssurer si le resultat de ces mêmes expériences seroit aussi constant sur des ^{hommes dont le bassin seroit} ~~basins~~ plus étroits que ceux dont j'ai vu de parler. ce que j'observe sur deux bassins secs semble me le promettre. Dans l'un dont le petit diamètre d'admetto supérieur n'est que deux pouces quatre lignes, l'épaisseur du milieu de la face externe de la symphise du Pubis ~~de la~~ la pointe de l'appophyse épineuse de la 4^e vertèbre du sacrum n'a que cinq pouces; dans l'autre elle n'est que de quatre pouces et un quart, et le diamètre de l'isthme a 16 lignes seulement.

S. XXIII. Il n'est pas aussi aisé de s'assurer de la longueur du diamètre transverse de ce même détroit. j'ai observé dans les bassins ordinaires, et même dans quelques uns de ceux que j'ai vu de citer, qu'elle se plus souvent de quatre pouces moindre que la distance d'une épine antérieure et supérieure de l'un des îles à l'autre. Mais on ne peut donner cela comme une règle à suivre dans tous les cas. ce qui est plus certain, quand le diamètre est beaucoup plus court que de coutume, celui de devant en arrière étant respectivement beaucoup plus grand. Les os pubis par leur union forment un angle aigu au lieu de se joindre plus ou moins arrondi qu'on observe dans les autres bassins.

S. XXIV. Quand le détroit supérieur n'est resserré que d'un seul côté, ou qu'il ressemble pour nous servir de l'expression de quelques uns, à un de ces bassins de propriété connue sous le nom de obliques on remarque que la voute de l'un des îles de ce côté est plus courbée en dedans, que le corps du Pubis est un peu déprimé, que les épines des vertèbres lombaires et du sacrum forment ensemble une ligne courbée vers ce même côté tandis que la pointe de l'autre et le coccyx se portent vers l'ischium opposé.

S. XXV. Quoiqu'il soit difficile de juger avec précision de l'étendue du détroit inférieur en examinant le dehors de cette partie, on ne doit cependant pas négliger de l'examiner. Lors que le sujet est assis, ou que les cuisses sont très fléchies, les tubérosités ischiatiques se faisant sentir aisément, on peut en distinguer la distance avec assez de sûreté pour ne pas se tromper lourdement dans la pratique de l'accouchement. on juge toujours beaucoup plus aisément de la largeur du même détroit entre la pointe du coccyx et la partie inférieure de la symphise du Pubis.

S. XXVI. Quand on veut avoir des connoissances plus positives de l'état du bassin intérieurement, il faut introduire un ou plusieurs doigts dans le vagin. on ne doit même jamais y manquer quand c'est une femme mariée qui fait le sujet de ces recherches, si on doit s'éloigner de cette règle on ne doit être qu'en faveur des jeunes personnes, qui jouissent encore des marques précieuses de leur innocence; ainsi on doit aussi épargner à la honte et la douleur de l'introduction du doigt dans l'anus: puis que cela ne peut en aucune manière conduire au but qu'on se propose. Par le procédé indiqué à l'égard des premières on juge plus aisément de l'étendue du détroit inférieur, dans ses différentes directions; de la largeur et de l'élévation de l'arcade du pubis; de la longueur de la symphise, de celle des épines ischiatiques et de leur direction; de la mobilité du coccyx, de la courbure du sacrum du siège et du volume des excroissances, lorsqu'il en existe: on peut enfin apprécier le degré d'étroitesse du détroit supérieur, en se servant du doigt introduit dans le vagin comme d'une échelle graduée qu'il est aisé de se former par l'exercice sur le cadavre. Pour cela on avance l'extrémité de ce doigt sur la symphise sacro-vertébrale, et on appuie le bord radial de sa base contre la partie inférieure de la symphise du Pubis. après avoir observé le point de ce doigt qui touchoit à cette dernière, on le retire du vagin on mesure la longueur comprise entre



Section 2nd

§. XXVIII

B. XXIX

[illegible]

à celle du détroit inférieur, ^{que} cela s'opposera quelque fois avec tant de peine qu'il ~~ne~~
feroit bien d'avoir recouru aux instruments pour délivrer la masse.

B. XXX.

[illegible]

S. XXVI.

Dans le véritable enclavement.
Dans ce dernier latéte étant fixé par deux points de la circonférence, au moins, et diamé-
tralement opposés, on ne le mouvoir même ni promener l'instrument comme il vient
d'être dit. Les os du crâne se croisent d'avantage, en général, les plus des ligaments sont plus
épais, la tumeur qui y survient acquiert plus de volume, et conserve son élasticité bien plus
longtemps; puis que la pression de latéte continue toujours. Toutes les parties de la femme
situes au-dessous de l'obstacle qui s'oppose à l'accouchement s'enflamment,
et deviennent si douloureuses, qu'elles supportent à peine la présence du doigt. Celles
qui sont interposées entre les deux points de contact, de latéte et du bassin, y sont comme
~~étouffées~~, surtout le col de la vessie et le commencement du canal de l'urètre; Pela
l'impossibilité d'uriner et de souder la femme tant que l'enclavement existe; & souvent
après l'accouchement l'impuissance de retenir les urines, soit ~~parce qu'il~~^{à cause} de la faiblesse
du sphincter de la vessie, soit parce qu'il s'est fait une érosion dans l'endroit indiqué,
et qu'il est ~~impossible~~ une communication libre entre cet organe et le vagin. D'ailleurs les ganglions
surviennent souvent dans toutes ces parties et laissent après eux des ulcères difficiles à guérir,
et des incommodités qui rendent la vie à charge et désagréable. Mon intention n'est pas

de Pousser Plus loing le tableau effrayant de tous les effets de l'enclavement, d'ébaucher que
je viens d'en ^{donner} doit suffire pour faire connaître combien cet état est à craindre, et en qui
il diffère de celui où la tête est seulement retenue et comme enbutée dans le Petit Bassin
je ne ferai ~~pas~~ observer depuis que l'enclavement n'est point aussi ordinaire qu'on le pens
heureusement pour les femmes; que les accoucheurs ont souvent abusé du mot sous
un prétexte quelconque qu'il ne peut arriver dans un bassin vicie aux derniers
degrés, et que dans tous les cas où il existe on peut introduire les forceps, m^{rs} des
après ces deux dernières remarques. mais si on consulte les observations on verra qu
la tête n'étoit point enclavée dans les différents cas qui lui ont fourni la dernière.

§. XXXII Lors que le Détroit Supérieur seul est resserré. L'inférieur étant Plus grand,
comme on l'observe assez fréquemment, le commencement du travail de l'accouchement
est semblable à ce que nous avons annoncé au Paragraphe 28. et 30^{es} une Partie
des mêmes symptômes se manifestent, mais si la tête a peine à franchir le premier
détroit, elle traverse les autres parties du Bassin et promptement que finissent l'accou
chement se termine en deux ou trois douleurs, tout étant bien disposé d'ailleurs de
côté des parties molles extérieures. on observe le contraire quand le Détroit inférieur
est affecté du même vice, le Supérieur jouissant de toute sa largeur naturelle, la tête
avancée d'abord avec facilité, et parvient en peu de temps dans le fond du Bassin; là
sa marche se ralentit et devient difficile, les effets indiqués ci-dessus ne tardent
pas à paraître. Si la tête s'engage un peu pendant la douleur elle remonte ensuite; insen
siblement elle s'allonge, ^{pour que} les forces de la femme se soutiennent et qu'elle et l'enfant
soit assez souples; elle s'accoutume à la flexion et la traverse enfin. Mais quand
ces deux conditions essentielles ne se réunissent pas l'accouchement ne peut s'achever
que par les secours de l'Art.

§. XXXIII Ce qui vient d'être exposé dans ce dernier Paragraphe, mérite toute l'attention des
jeunes praticiens. Il faut déjà une certaine expérience pour se garantir de l'erreur en
pareilles circonstances, et pour ne rien faire qui ne soit conforme au vœu de la Nature
et aux règles de l'Art. Il est si difficile de juger où l'on peut se borner l'action de la Matrice
et des organes auxiliaires, dans l'un et l'autre cas, que l'instant où l'on croit ces Puissances
incapables de surmonter l'obstacle qui s'oppose à la sortie de l'enfant est celui où le
plus souvent elles se triomphent; Tandis que quelquefois l'accouchement paroit traîner
terminer lors qu'il est à peine commencé et que la Nature se signale contre les
difficultés que lui présente le peu de largeur du Détroit, si on ne vient à son secours. tel fut
le sort de la femme à qui appartenoit le Bassin, où la courbure du Sacrum manquoit entièrement,
et duquel j'ai fait mention au Parag. XIV. on lui annonça un prompt délivrance Parce
que la tête étoit avancée beaucoup dans les premières douleurs qui avoient suivi. le flot
des eaux; mais elle parvint presque aussitôt. La tamefaction du cuir chevelu fit croire que sa
marche étoit seulement ralentie; de sorte qu'après avoir attendu vainement pendant plus
de quarante huit heures, on fut obligé de terminer l'accouchement. Imaginant d'après
un délai aussi long que l'enfant devoit être mort, on lui ouvrit le crâne à dessein d'en
diminuer le volume par la sortie d'un peu de sang pour l'arracher ensuite du Bassin par la même
cuvette du cervix. Celle-ci déjà épuisée ne survécut que peu de jours à son enfant. Je garde
le silence sur certaines circonstances relatives à ce dernier, qui en rappellent à la mémoire des
praticiens. Le siècle de Peau et de Mauvaises ne feroient que leur retracer à des quelle
prudence on doit user de ces méthodes barbares et sanguinaires (*).

Quand -

*. m^{rs}. Solages Temoins d'aveu fait de peuvra le bassin de la femme qui n'a été mesurée depuis

ou qu'il n'y fut au moins très engagé. De sorte que personne n'a encore recommandé expressément dans ses écrits & s'en servio quand elle est entièrement au-dessus du détroit Supérieur. Ce précepte pouvoit cependant émaner des réflexions & de l'observation du Médecin anglois dont j'ai déjà parlé: aucun Praticien n'a fait un usage plus général de cet instrument, ni ne s'en est servi plus méthodiquement qu'elle. Nous pensons que ceux qui ont traité cet objet depuis n'avoient point assez consulté ses ouvrages, puis qu'ils ne les ont pas cités. On ne peut se refuser de voir d'après leur lecture que ces auteurs n'ait porté le foreps sur la tête

pour se décider de propos sur le Parti le plus convenable, les délais trop longs dans ce cas étant également nuisibles à l'un & à l'autre. La timidité peut avoir des suites aussi fâcheuses que les entreprises téméraires dans une infinité d'autres. On ne doit rien espérer de mieux ni des moyens ordinaires lors que la disproportion qui s'oppose à la sortie de l'enfant est aussi grande, et il seroit des plus dangereux de la laisser surprendre par les apparences; de croire par exemple, que la tête s'engage dans le petit bassin parce que le cuir chevelu en se tuméfiant s'avance dans le vagin; ce qui paroît d'autant plus aisé, si on ajoute foi à l'observation de Delamotte, d'observer & autres, que ces tumeurs des tegumens sont devenues assez volumineuses pour remplir le canal dont il s'agit & y figurer comme une seconde tête. Une pareille méprise en éloignant l'accouchement de la véritable route qu'il devoit suivre pour assurer le salut de la mère & de l'enfant ne feroit souvent que précipiter l'un & l'autre au tombeau.

Section Genée

§ XXXV.

On peut réduire à six Méthodes principales toutes celles qui ont été mises en usage jusqu'ici pour terminer l'accouchement dans les différentes circonstances qui font le sujet de ce Mémoire

- 1^o L'extraction de l'enfant par les Pieds.
- 2^o par le moyen des crochets ou autres instruments de la Genée,
- 3^o Par l'usage du foreps ou du levier,
- 4^o L'opération Césarienne.
- 5^o L'amputation du Bassin
- 6^o L'accouchement prématuré.



Ces Méthodes ne doivent pas être tentées indifféremment dans tous les cas; la même ne peut toujours suffire. Elles ont leurs avantages & leurs inconvénients & leur choix doit être lié à la connoissance de l'état & de la nature du malin, de la mère & de l'enfant comme l'effet l'est à la cause. Analysons les successivement, & exposons dans quels cas on doit les employer.

§ XXXVI.

Dans le rapport de plusieurs auteurs au premier, recommandé de reporter la tête, quand son volume trop considérable s'oppose à l'accouchement,

entièrement libre au dessus du Bassin. Quoi qu'il n'en fasse pas un usage bien
formel; on y voit qu'il n'avoit d'autres vues que d'étendre l'usage à tous
ces cas, lors qu'il en fit faire un second plus long que celui dont il s'étoit toujours
servi et surtout en y ajoutant une double courbure à l'instar de celle que nous
remarquons aujourd'hui sur le forceps de M^r Levret. On ne fit construire ce
nouvel instrument pour prendre la tête de l'enfant en devant, & l'écarter, par la saillie
du Sacrum et retenue au dessus des os pubis, ce qu'il ne pouvoit faire
exactement

Cette tête n'étoit point enclavée dans les différens cas que l'on voit souvent

§. XXXII Lors que le détroit supérieur seul est resserré l'inférieur étant plus grand,
comme on l'observe assez fréquemment, le commencement du travail de l'accouchement
est semblable à ce que nous avons annoncé au Paragraphe 28^e et 30^e une partie
des mêmes symptômes se manifestent, mais si la tête a peine à franchir le premier
détroit, elle traverse les autres parties du Bassin & promptement que souvent l'accou-
chement se termine en deux ou trois douleurs, tout étant bien disposé d'ailleurs du
côté des parties molles externes. On observe le contraire quand le détroit inférieur
est affecté du même vice, le supérieur jouissant de toute sa largeur naturelle, la tête
avance d'abord avec facilité, et parvient en peu de temps dans le fond du Bassin, là
sa marche se ralentit & devient difficile, les efforts indiqués ci-dessus ne tardent
pas à paroître. Si la tête s'engage un peu pendant la douleur elle remonte ensuite; j'en-
semble elle s'allonge, ^{pour que} les forces de la femme se soutiennent et qu'elle soit assez souple; elle s'accoutume à la fatigue et la traverse enfin. Mais quand
ces deux conditions essentielles ne se rencontrent pas l'accouchement ne peut s'achever
que par les secours de l'art.

§. XXXIII Ce qui vient d'être exposé, dans ce dernier Paragraphe, mérite toute l'attention des
jeunes praticiens. Il faut déjà une certaine expérience pour se garantir de l'erreur en
pareilles circonstances, et pour ne rien faire qui ne soit conforme au plan de la Nature
et aux règles de l'art: il est si difficile de juger où l'on peut se borner l'action de la Matrice
et des organes auxiliaires, dans l'un ou l'autre cas, que l'instinct où l'on croit ces puissances
incapables de surmonter l'obstacle qui s'oppose à la sortie de l'enfant est celui où la
plus souvent elles ont triomphé; Tandis que quelquefois l'accouchement paroît prêt à se
terminer lors qu'il est à peine commencé et que la Nature se lève contre les
difficultés que lui présente le peu de largeur du détroit, & on ne vient à son secours, trop
tôt de la femme à qui appartient le Bassin, où la courbure du Sacrum manquoit entièrement,
et duquel j'ai fait mention au Parag. XIV. on lui annonça un prompt délivrance parce
que la tête étoit avancée beaucoup dans les premières douleurs qui avoient suivi. Le flot
des eaux; mais elle parvint presque aussitôt: la tamification d'un chapeau fit croire que sa
marche étoit seulement ralentie, de sorte qu'après avoir attendu vainement pendant plus
de quarante huit heures, on fut obligé de terminer l'accouchement. Imaginant d'après
un délai aussi long que l'enfant devoit être mort, on lui ouvrit le crâne d'un dessein d'en
diminuer le volume par la sortie d'un peu de sang, pour l'arracher ensuite du Bassin par le même
moyen du crâne. Celle-ci déjà épuisée ne survécut que peu de jours à son enfant. J'ajoute
le silence sur certaines circonstances relatives à ce dernier, qui en rappellent à la mémoire des
praticiens. Le siècle de Peau et de Mauveaux ne seroit que leur retracer à des quel-
qu'un on doit user de ces méthodes barbares et sanguinaires (*)

Quand -

*. M^r Solagren Témoin de ce fait se procura le Bassin de la femme qui n'a été misé depuis -

§ XXXIV. Quand le Bassin est retterré aux derniers degrés assignés soit dans toutes ses parties en même tems ou dans une seule, son petit Diamètre n'ayant pas deux pouces et demi d'étendue, l'accouchement ne peut se faire par cette voie si ce n'est qu'on ne mutilé l'enfant pour l'extraire en détail. C'est ici le conseil de tous les hommes Sensibles. L'accouchement, comme l'art de la guerre, ainsi dit, du sort de la mere et de l'enfant, a besoin d'une fermeté d'ame peu commune pour se décider. A propos sur le Parti le plus convenable, les delais trop longs dans ce cas étant également nuisibles à l'une et à l'autre, la timidité peut avoir des suites aussi facheuses que ses entreprises temeraires dans une infinité d'autres. On ne doit rien esperer d'autre ni des moyens ordinaires lors que la disproportion qui s'oppose a la sortie de l'enfant est aussi grande, et il seroit des plus dangereux de se laisser surprendre par les apparences; Devoir par exemple, que la tête s'engage dans le petit bassin parce que le cuir chassé en se tumefiant s'avance dans le vagin; ce qui paroit d'autant plus aisé, si on ajoute foi à l'observation de Delamotte, Roidier et autres, que cette tumeur des tegumens peut devenir assez volumineuse pour remplir le canal dont il s'agit et y figurer comme une seconde tête. Une pareille meprise en éloignant l'accouchement de la véritable route qu'il devoit suivre pour assurer le salut de la mere et de l'enfant ne feroit qu'avancer que précipiter l'un et l'autre au tombeau.

Section 3^{eme}

§ XXXV. On peut reduire à six Methodes Principales toutes celles qui ont été en usage jusqu'ici pour terminer l'accouchement dans les différentes circonstances qui font le sujet de la memoire

- 1^o L'extraction de l'enfant par les Pieds,
- 2^o par le moyen des crochets ou autres instrumens de ce genre,
- 3^o par l'usage du forceps ou du levier,
- 4^o L'opération Césarienne,
- 5^o L'amputation du Bassin
- 6^o L'accouchement prématuré.



Ces Methodes ne doivent pas être tentées indifféremment dans tous les cas; la même ne peut toujours suffire. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients et leur choix doit être lié à la connoissance de l'état comme nature du bassin, de celui de la mere et de l'enfant comme l'effet l'est à la cause. Analysons les succinctement, et exposons dans quels cas on doit les employer.

§ XXXVI. Quoiqu'Actus au rapport de plusieurs auteurs ait le premier, recommandé de repousser la tête, quand son volume trop considérable s'oppose à l'accouchement,

se servir de la premiere que dans le cas où le volume de l'enfant, reconnu par moi
surpassa tellement la largeur du bassin qu'elle ne peut ~~pas traverser~~ ^{se faire passer} ~~par le bassin~~
être suffisamment comprimée avec le forceps, pour le traverser, ou lors qu'elle y est
engagée de manière que cet instrument ne peut être appliqué convenablement. cette
methode ne convient donc exclusivement que dans les femmes dont le bassin est
retréci au 4^{ème} ou au 5^{ème} degré, et dans l'enclavement, s'il peut exister, où la
femelle seroit également servie par tous les points de sa circonférence. Je croi
excessivement rare qu'on soit obligé d'inciser le tronc de l'enfant, et de le
diviser en plusieurs parties pour faciliter son issue de la Matrice. Il est construit
de manière qu'il s'applique aisément, et qu'il franchisse le bassin sans une extrême
difficulté; pourvu qu'on ait soin de placer les épaules selon le plus grand dia-
mètre de l'enfant. Je fais cependant en excepter le cas de Monstruosité et
d'Hydropisie, qui peuvent se remonter en même temps que le bassin de la mère est
resserré.

§ XLII

Les Crochets ne conviennent et ne peuvent suffire pour terminer l'accouchement
que lorsque le volume de l'enfant est proportionné aux ouvertures du bassin
quand le rapport favorable n'existe pas, ils ne peuvent le procurer; au moins qu'on
arrache successivement quelques unes des Parties de l'enfant pour donner issue au
cerveau et favoriser l'issue du reste, comme plusieurs l'ont pratiqué. mais
cette manière d'agir peut avoir des suites trop fâcheuses pour que nous ne
cherchions pas à empêcher nous rendre au même but par une voie plus douce. Plus
sûre. Quand on agit avec les crochets comme nous venons de le dire, la pointe
de ces instruments venant à s'écarter des Parties de l'enfant s'implantant dans celles
de la femme qui y sont en quelque sorte engagées; ou bien en déchirant les os, il
enlevé des angles tranchans et des inégalités en forme de dents de scie, qui bles-
sent et déchirent ces mêmes Parties: ce qu'on évite toujours en incisant le crâne avec
précision dans l'endroit d'une suture. on voit d'après cela qu'on ne devroit
se servir de crochets que dans le cas où l'enfant peut traverser les ouvertures du
bassin. Quand elle est telle naturellement ces moyens ne doivent être mis en
usage qu'au défaut du forceps et dans les circonstances qui requièrent celui-ci;
quand elle est trop grosse, il faut commencer par l'élargir et la diminuer par
la traction du Cerveau; les crochets alors ne sont que des moyens auxiliaires, à ceux
qui conviennent pour remplir cette première indication.

§ XLIII.

Je dois réserver à notre Siècle de dévouiller l'art d'accoucher de cette espèce
de barbarie qui tenoit lieu de connaissance à la plus part de ceux qui l'exerçoient.
La découverte du forceps a plus contribué à cette heureuse révolution que les efforts
reunis de tous ceux qui avoient cultivé cet art jus qu'à lors. Apres cet instrument
fut connu, qu'on s'empressa d'y faire des changemens; si aucun n'en a subi
autant, ni de plus grands, c'est peut être parce qu'aucun autre n'avoit paru plus
nécessaire ni plus salutaire. M^r devent et le docteur Smellie en sont devenus et
comme les attendus par les corrections utiles qu'ils y ont faites, et personne n'a
mieux mérité qu'eux, le titre glorieux de bienfaiteurs de la Patrie, quoique cet
instrument ne jouisse pas encore de la perfection qui seroit à désirer, il faut
avouer qu'il est bien difficile d'y faire des changemens utiles, sans diminuer
des avantages qu'il possède. L'expérience m'a fait connaître quelques uns des
défauts; j'attendrai qu'elle ait confirmé l'utilité des corrections que j'ai cru
devoir y faire avant de les publier.

§ XLIV

Les Auteurs du forceps ne sont pas ceux qui en ont tiré le meilleur Parti
il semble que leur génie se soit épuisé pour le produire; et loin d'en écarter les
avantages; ils en ont borné l'usage à un très petit nombre de cas: ils attendoient
presque tous pour l'appliquer que la tête fut descendue dans le petit bassin
ou qu'elle

SS. XLV

Que falloit-il donc de plus de la Part de l'Orfèvre pour engager ceux qui sont venus depuis à se servir de cet instrument dans les mêmes circonstances? Si nous trouvons si peu de praticiens qui aient inséré cela n'en recherchons la vraie cause que dans la difficulté d'exécution de cette méthode; difficulté qui ne vient que du défaut de préceptes assez clairs à cet égard, et qui d'habitude soit assez facile le plus souvent.

SS. XLVI.

§. XLVII.

*|| Forcipe caput ac superiore pelvis apertura solutum. || obs. 1^a opus. med. Boissier
pg. 206.

son moyen, diminuer l'épaisseur de la tête au dessous d'un point, ~~le plus en avant~~ On ne doit pas
se dissimuler combien cet instrument est dangereux pour l'enfant quand le bassin n'a
cette ~~largeur~~ ^{largeur} même ~~qu'il~~ ^{qu'il} n'a que trois pouces moins un quart. il
est rare qu'on l'amène vivant; à cause de la violente pression qu'éprouve le
cerveau, ou bien il est à craindre qu'il ne perde peu de temps après sa naissance
~~à cause~~ ^{à cause} des fractures ~~ou~~ enfoncées des os du crâne, presque inevitables dans tous
ces cas. Pour déterminer s'il est plus à propos de se servir alors du forceps que
de tout autre moyen, il faut examiner si les suites en sont moins fâcheuses.

§. XLVIII.

Si nous n'avions que la mère, ou l'enfant à conserver dans cette déplorable
circonstance, il seroit aisé de prononcer sur le choix de la méthode la plus sûre pour
cela, mais ce n'est pas ^{assez} de même l'une en suit l'autre, il faut s'efforcer d'en
pas enlever l'autre; ~~mais~~ ^{car} réellement ~~les deux~~ ^{les deux} de l'autre, ~~ils~~ ^{ils} ne peuvent
malheureusement, en partageant également les effets salutaires. Si on met assez sou-
vent à couvert les jours de la mère en tirant l'enfant par les pieds, par le moyen
du forceps, des crochets et autres instruments de ce genre, nous avons vu combien
celui-ci est exposé dans toutes ces méthodes; puis que la mort toujours inevitable par l'une
est des plus à craindre dans les autres. L'opération césarienne d'un autre
côté la plus douce et la plus favorable de toutes ~~pour l'enfant~~ ^{pour l'enfant}, est
si dangereuse pour la mère qu'on ne peut y penser sans admirer le courage de celle
qui s'y soumet et sans gémir en même temps sur sa destinée. Quoique la mort jus-
qu'ici en ait paru la suite la plus ordinaire, on ne manque cependant pas d'exem-
ples de femmes ~~à qui~~ ^{à qui} elle a eu le meilleur succès. on en trouve même plusieurs
où l'on voit qu'elle n'a été accompagnée d'autres accidens que de ceux qui sont
ordinaires aux grandes plaies des parties charnues et qui paroissent même ne s'opposer
à leur réunion; ce qui doit rassurer et les femmes qui doivent la subir et le praticien
qui doit la faire. Ces mêmes exemples ont déjà fait penser que les accidens qui ont
moisonné un aussi grand nombre de femmes à la suite de ces opérations, depen-
droient moins de la nature des parties qu'elle interesse, que de l'état morbifique
où elles étoient déjà au moment où l'on y a plongé l'instrument. Mais en
admettant ces simples réflexions comme autant de vérités, la section césarienne
n'en doit pas moins paroître une opération des plus graves et des plus dangereuses,
car il n'est pas au pouvoir de celui qui doit opérer de prévenir, ni d'éviter toutes
les circonstances qui peuvent nuire au succès de l'opération. L'attaché du Placenta, par
exemple, dans la région de la matrice qu'il faut nécessairement inciser, est une
de ces sources funestes qu'on ne peut prévoir ni détourner. Ce n'est qu'en opérant
qu'on le découvre, alors le mal est déjà fait, le sang coulant à grands flots en
entraîne la femme en peu de minutes sur le bord de la ruine.

§. XLIX.

On ne doit donc pratiquer cette opération qu'autant qu'on a des certitudes
presque positives que l'enfant ne pourra sortir vivant par la voie ordinaire;
mais on trouvera nous ces certitudes dans le cas dont il s'agit. D'après les
exemples, que j'ai rapportés ci-dessus, de femmes très contre-faites, qui se sont délivrées
naturellement, quoique le Bassin n'eût pas au-delà de trois pouces moins un quart
de largeur dans son petit diamètre, il faudroit, pour déterminer le degré de
compression que la tête peut subir que l'enfant perisse, et celui qui produira
la mort.

L'effort inévitablement, lequel nous parait d'autant plus difficile qu'une compression
 légère a souvent donnée lieu à cet accident, tandis qu'une plus forte n'en a pas toujours
 été suivie. D'ailleurs il n'est pas possible de reconnaître au juste à quel point il est
 nécessaire de comprimer la tête pour lui faire franchir le Bassin-Vie. Selon Van Swinderen
 de dix lignes seulement. Par ce que son volume relativement à ce dernier ^{passage} ~~est~~ ^{est} ~~est~~
 infini qu'on ne peut deviner par le toucher. Ce moyen nous fait distinguer au plus
 si la tête est très grosse ou très petite; si les os sont plus solides que de coutume ou plus flexibles,
 ce par conséquent. Les dispositions ~~favorables~~ plus ou moins favorables auxquelles elle
 doit éprouver. Quand ^{la} ~~elle~~ est dure, que les os sont plus flexibles, les suture étroites et serrées
 une ~~bonne~~ compression donnée produira de plus grands désordres dans l'organisation
 du cerveau que si elle étoit molle; parce que les os plus souples alors, se déforment plus
 aisément, et se croisent moins qu' dans le premier cas. Dans celui-ci la compression du
 cerveau est toujours proportionnée à la diminution que la tête éprouve. D'un côté, soit selon
 la longueur, soit ^{ou} selon l'épaisseur; dans l'autre au contraire, cette compression est moindre,
 parce qu'en diminuant la tête dans un sens elle s'augmente aisément dans un
 autre, ce que la nature ne fait pour ainsi dire que changer de forme, ajoutés accien-
 que les os se résistent dans le 1^{er} cas et que leur fragilité s'enfoncent dans la substance
 du cerveau, ce qui n'arrive pas dans le dernier. Les observations que j'ai rapportées dans
 la première partie de ce mémoire annoncent à quel point, une tête qui jouit de ces dispositi-
 ons, peut changer de forme sans que cela influe sur la vie de l'enfant. Je sens tout
 la force de l'objection qu'on peut me faire ici; les femmes qui font le sujet de
 ces observations n'étant délivrées seules, la maturation qui est arrivée à la tête
 de leurs enfants s'est faite peu à peu et par des gradations infinies qu'on ne peut
 imiter avec aucun instrument; cela est vrai; mais il n'est pas moins qu'on
 peut agir avec toute la bonté possible et nécessaire, quand on se sert du forceps.

S. L.

On apperoit dans ce que nous venous dire que l'usage du forceps n'est pas moins dangereux pour l'enfant, quand le bassin est resserré ~~peu~~ ^{peu} indiqué dans le paragraphe, xi-^e et xii, que l'opération césarienne pour la mère. La balance parviendroit égale en cela il reste à savoir de quel côté on doit la faire pencher; lequel des deux il vaut mieux exposer, soit la mère ou l'enfant. Mais qu'est-ce si difficile à trouver ~~l'un d'eux plongé dans l'autre sans un danger évident~~. ce sont les circonstances qui doivent en décider; le jugement d'un seul d'ailleurs ne peut faire loi dans un cas de cette espèce (*).

SS. LI.

Il reste à dire pour présenter sous le point de vue général que nous nous sommes proposé, les avantages et les inconvénients de l'opération césarienne. De toutes les méthodes d'accouchement, celle-ci est la seule qui puisse dans tous les cas, ouvrir une issue libre et facile au fœtus. C'est l'avantage qu'il convient d'apprécier quand le mère est morte, à moins que l'atèle ne soit déjà très engagée dans le bassin: tandis qu'on ne doit la pratiquer sur celle qui est vivante que lors qu'il est absolument impossible que l'enfant, renfermé dans son Sein, puisse en sortir vivant par la route ordinaire. Plusieurs accoucheurs ^{perissent à avoir} ~~se sont~~ déterminés dans ces cas que par l'impossibilité d'extraire l'enfant dans la matrice ou d'extraire manuellement d'un des Pieds de l'enfant, j'ai vu de l'étroitesse du bassin, personne ne peut nier que l'opération césarienne ne soit indispensable alors, mais ne doit-on la faire que dans ces cas exclusivement? Pour le penser il faut ^{droit} ignorer la disproportion qui existe entre la main de plusieurs des

*. Japonais. Sous Silence ^{acquiescence} ~~Courage~~ dévot et obéissant; en tout aux de combien les moines sont inférieurs au prêtre dans tous les cas d'ordre spirituel.



qu'il ont avancé qu'on ne pouvoit le renverser dans l'ouvrage. Mais ^{il n'est} ~~il est~~ plus permis
de douter ^{parfaitement}. ~~Nous n'est pas généraux de dire~~, ^{et} Si Quelqu'un tint encore au
sentiment de Bernier, Dulaurans, Mauvillon et autres, c'est que ^{cet écartement} ~~ils~~ n'arriva pas aussi —
souvent qu'on l'a publié et que chacun ayant cherché à se convaincre par ses propres
sens, plusieurs n'en eurent rien trouvé de semblable.

§§. LIV. J'ai examiné moi-même un très grand nombre de femmes Parniciennes qui viennent se prêter à l'instruction de mes élèves, et qui m'ont une vie dure et laborieuse. J'les ai interrogé avant, pendant et après l'accouchement, et j'en n'ai rien remarqué jusqu'ici qui ait pu me faire naître le moindre soupçon de l'existence d'un écartement. J'en excepterai cependant deux, d'une constitution assez délicate, qui, à la fin d'une grossesse traversée de mille accidens, et terminée par un accouchement pénible et laborieux, éprouverent des douleurs dans les lymphatiques sacro-iliaques et dans le bas du ventre, mais le toucher n'a pu m'y découvrir aucune marque de cette espèce de diastasis. Je n'ai rien vu de plus à l'ouverture du cadavre d'un certain nombre ^{d'autres} femmes, qui étoient mortes à la suite de l'accouchement; parmi lesquelles le bassin de quelques unes n'étoit que trois pouces de ~~petit~~ diamètre supérieure-ment.

S. LV. D'après cela en admettant que cet effet soit aussi constant que les Hommes en dignes. De la plus grande confiance l'ont annoncé, on ne peut s'en vanter au moins qu'il ne soit très petit dans les plus parts des femmes, ce que bien peu d'accouchés à la suite d'une longue pratique n'en pourroient citer une douzaine dans lesquelles les os pubis se seroient écartés jusqu'à un pouce. Je n'ai observé qu'une seule fois l'écartement porté à ce point et même un peu au delà. on pouvoit ^{les} leigner ~~ces os~~ de seize à quatorze lignes, et chaque os innominé, du sacrum, de deux à trois, de l'articulation intermédiaire des premiers étoient entièrement dissous, et il ne restoit pour ainsi dire que l'écorce de leur symphyse. Le Cadavre avoit séjourné pendant quelques tems dans un amphithéâtre, où il avoit servi aux exercices anatomiques. De sorte que la putréfaction avoit pu augmenter la laxité ^{des} ligamens. La femme étoit morte en couches, comme l'annonçoit l'état de la matrice, qui étoit très grande, et le contenu, plus de la moitié du Placenta en plusieurs lambeaux. La délivrance que j'ai ^{remarquée} dans ces cas étoit-elle une suite des efforts de l'accouchement, ou bien étoit-ce un secours semblable à celui que la divine Providence accorde à ^{autres fois} ces femmes Égyptiennes comme le pensoit le Rabin Joar dont parlent quelques ^{autres fois} auteurs? L'inspection du Bassin auroit pu faire présumer alors que la nature en étoit ^{quelques fois} le prodige d'un certain ~~cas~~ — puisque son plus petit diamètre avoit près de quatre pouces et un quart les os étoient en contact (*). Le Bassin étoit soumis ^{dans le tems} aux yeux de l'Académie de Médecine.

S. LVI. Les avantages attribués à l'écartement des os Pubis ont paru si plausibles

(*) J'avois avoisi demandé dans une autre occasion qu'un Bassin de grandeur naturelle étoit plus grand qu'il ne le falloit nécessairement pour l'écoulement. Si j'ai pris ou donné ce terme des contradictions sur ce sujet: j'en suis de très bonne foi; qu'on avoit adopté mon sentiment et que celui qui l'avoit le plus rejeté, s'en étoit servi dans des réflexions sur la nature du pubis.

accrédité de bon

qu'un médecin du 16^e Siècle, l'un des plus grands destructeurs de l'opinion ~~de son~~ ^{de son} temps, n'a pu s'empêcher d'en être seduit. Puis qu'il compte parmi les obstacles à l'accouchement l'union trop serrée des os Pubis. Quand on examine l'os Pourroit-on voir ces avantages ou ne peut s'empêcher de voir qu'on les a singulièrement exagérés. S'ils ne dépendent en effet que de l'amplication que cet écartement produit dans le Bassin il n'y auroit de rien à bien peu de chose. Dans la plus part des femmes, Puisque cette augmentation est nulle ou pres que nulle, et que l'aillende cette caverne est déjà plus large qu'il ne faut absolument pour la sortie de l'enfant. Dans celles dont le Bassin est vicié les difficultés, qui s'opposent à l'accouchement, Brodenant presque toujours du peu de longueur du Petit Diamètre dudit vicié Supérieur, on ne doit espérer des avantages de ce côté que de l'accroissement de ce Diamètre; or il est démontré dans la thèse que j'ai soutenue dans ces écoles, qu'il ne peut s'augmenter que d'un ou deux lignes à la rigueur quand l'écartement des os Pubis ^{s'étend} jusqu'à un pouce et même au-delà. Dans quel cas l'accouchement en deviendra-t-il donc plus facile? il est aisé sans doute de déterminer ~~cela~~ d'après ce qui vient d'être dit; Mais on ne peut le prévoir, ni le déterminer par aucun moyen. Car personne n'osera se flatter de découvrir si le volume excédant de l'os n'est que de deux lignes seulement. Maintenant supposons que cela soit possible: est-il au pouvoir de l'Art de procurer l'écartement nécessaire pour faire cesser cette disproportion, sans diviser les substances qui unissent les os? Je n'existe je pense aucun exemple qui puisse le faire croire. Seront-elles les Moxes proposées par Severin Pineau et recommandés de plus avec tant d'eloges qui pourroient produire un pareil effet? Si cela est avec quelle lenteur n'aurait-ils pas agit, car pour nous l'attendre d'un travail d'une heure, d'un jour, même d'un mois, si l'opération plus indolente que nous, s'en occupe des mois entiers et si elle com-
mence quelques fois ce travail dès les premiers tems de la grossesse?

§. LVII

Si cet écartement est aussi utile qu'on le publie, il est bien étonnant qu'on ait pensé à l'Art de Couper la Symphyse qui s'y oppose, et que personne n'ait osé le faire avant Mr Sigault. L'idée de la Possibilité de cette opération ne paroît pas absolument nouvelle, si on consulte Severin Pineau. Car elle peut être interprétée d'un passage de ses opuscules que je copierai ^{exactement} ~~paraphraserai~~ Pour ne point en altérer le sens: cet auteur après avoir parlé des Précautions que la Nature a prises dans la construction de l'enfant, pour faciliter sa naissance, et avoir annoncé qu'elle est bien plus admirable dans l'écartement des os du Bassin, continue par ces mots. Il præterea ignobiliores partes nobilioribus semper minorant et obsequantur; nec non continentur a externa non tantum dilatari sed etiam ~~locari~~ ^{locari} scari tuto possunt, uti interius succuratur, ut Galenus ait. et Nemo sanè est in medicina versatus, qui non noverit pueros in utero contentos, multo nobiliores esse Maternis ostibus, pelvim, et vulgo loquimur, constituentibus (*) // Si ~~en~~ ^{en} Mr Sigault, à qui on ne peut refuser la gloire d'avoir présenté cette idée dans un plus grand jour, et de l'avoir la première mise en pratique parmi nous, a imité l'Art ^{qu'il nous propose} nous devons lui savoir gré de son entreprise et d'avoir osé franchir une partie des Règles qui doivent faire en quelque sorte la base de toutes nos opérations. Mais si la méthode n'est point aussi salutaire qu'il la publie, que le même esprit qui l'a portée à l'extrême, nous fasse craindre pour les femmes contrefaites qui auroient recours à ce qu'il nous propose de cette

(*) Severinus Pineus - opuscul. anatomie et physiologie - capitulo decimo.

de cette opération aura séduit en attendant qu'une expérience fatale la replonge dans l'oubli.

SS. LVIII.

Quand le médecin mis sa nouvelle méthode en parallèle avec l'opération ^{Césarienne} lui donna la palme dans les écoles d'Angers, elle n'avait été faite que sur ^{le cadavre humain} ~~quelques~~ ^{sur des femmes} vivantes, que leur conformation mettait à l'abri de la difficulté ~~d'opérer~~ ^{de l'opérer}. ~~Je~~ ^{Je} croyais que les os pubis ne pouvoient s'éloigner que d'un pouce ou quelques lignes ce qui lui parut, néanmoins, suffisant pour établir le rapport nécessaire à l'accouchement. ~~quelques~~ ^{quelques} temps après, je mis en question ce qu'il semblerait avoir annoncé comme un fait, et j'en fis le sujet d'un programme déjà cité. Quelques expériences faites sur des Bassins secs et resserrés à différents degrés m'avoient appris qu'en écartant les os pubis de treize à quatorze lignes, on n'augmentoit nullement le petit diamètre du détroit supérieur, le transversal beaucoup plus, et que les Symphises sacro-iliaques s'enthousaient de plus en plus. D'accord en quelques points avec Mr. Sigault nous ne les fumes pas d'accord dans nos conséquences, puis qu'il accorde à sa méthode toute la prééminence possible sur la section césarienne, tandis que je démontrai au contraire, qu'elle ne pouvoit frayer un chemin assez vaste au fœtus: Si le fœtus dans quelques cas où le forceps courbé pouvoit servir admirablement bien.

SS. LIX.

À cette époque à la vérité aucune expérience n'avait été faite sur la femme morte ^{et ce résultat n'en eût pas changé} ~~on~~ ^{on} ignorent que les os pubis, après la division de leur Symphyse, pussent s'écarter de deux poudres en demi. Cette lumière imprévue alors, frappée depuis les yeux de Mr. Alphonse Le Roy, ne lui devint plus dans le projet de son ouvrage qu'une méthode simple et sûre d'éviter l'accident. Je m'en servis le Partisan le plus zélé et l'avois si sûrement devancé dans l'expectation qu'il en eut la gloire. Il parut, comme il le dit, que le succès qu'à la lueur du succès que leur promit cette dernière découverte, qu'ils se réunirent pour en faire le premier essai sur la femme morte. Il s'étoit bien démontré qu'ils eussent obtenu les deux poudres en demi d'écartement qu'ils ont annoncés, et qu'on puisse toujours les obtenir sans craindre de plus grands accidents que ceux qui l'ont accompagnés chez cette femme, on ne pourroit refuser à cette méthode quelques avantages dans certains cas, où l'enfant jusqu'à être victime de celle qu'on a mise en usage. Mais le voile qu'ils ont jeté sur une partie de leurs démarches, et l'enthousiasme qu'ils ont montré dans le récit ne permet pas de juger d'après le succès qui a couronné leur entreprise.

SS. LX.

Il est bien constaté que les os pubis peuvent être éloignés de deux poudres en demi. Des expériences faites sur plus de vingt femmes mortes en couchant l'ont démontré. on peut même les écarter d'avantage car leur réduction est en quelque sorte illimitée, dès que les Symphises sacro-iliaques sont entr'ouvertes avec rupture des ligaments et du périoste. C'est ce délabrement dont les suites ~~peuvent~~ ^{peuvent} être des plus fâcheuses, qui doit réprimer la fougue de ceux qui se sont laissés entraîner trop précipitamment, dans le Parti de cette nouvelle opération. Il est difficile de ^{lui} ~~prescrire~~ ^{prescrire} des limites ~~de l'opération~~ ^{de l'opération} parce qu'on ne sait où il commence ^{ce qui} ~~il~~ la fait plutôt ou plutôt selon le degré d'entassement du bassin et le relâchement que produit la grossesse dans toutes les Symphises. Dans des femmes dont le petit diamètre du détroit supérieur n'étoit que de trois poudres et un quart, les os pubis étoient à peine écartés de quatorze à quinze lignes ^{lors que} ~~que~~ les Symphises sacro-iliaques ont paru ou ~~ont~~ ^{ont} été avec rupture du périoste et des ligaments, mais



* Si on a soin d'insérer
des loins ou enveloppes
dans le ventre.

Le premier étoit déchiré à un pouce au devant de la Symphise Pubes. ces mêmes déchirements sont arrivés un peu plus tard dans les Bassins de grandeur ordinaire sans qu'on puisse déterminer à quel point ils ont commencé, et où il auroit fallu berner l'écartement des os pubis pour les prévenir. Ce qui auroit été facile cependant en épouillant ces endroits du Péritoine.

S. LXI.

Les mêmes expériences ont prouvé qu'en écartant les os Pubis de deux pouces on éloignoit leur tubérosité de quatre à six lignes, et même plus, du milieu de la Saillie du Sacrum, au delà de ^{quelques autres} distance naturelle. Le Petit Diamètre du Détoit Supérieur, considéré jusqu'au point de l'hyalis, de ^{même} ~~est~~ où se trouve la partie Gibbeuse de la tête, s'accroit au moins de la même longueur. Nous avons vu que le diamètre transversal, et surtout celui du Détoit, inférieur augmentoit beaucoup plus, et personne ne peut ignorer que l'arc du Pubis s'élargisse dans tous les cas dans les mêmes proportions que les os pubis s'éloignent l'un de l'autre. très rarement les os pubis ~~se joignent~~ parcourent un chemin parfaitement égal dans leur diduction; ce qui fait que le Bassin s'agrandit plus d'un côté que de l'autre, et qu'une des Symphises Sacro-iliques souffre davantage. La différence que nous avons observée dans l'écartement de ces dernières a été de deux à sept lignes.

S. LXII.

Toutes ces expériences ayant été faites sur des Bassins assez grands pour l'accouchement (*), on pourra nous objecter que ^{leur} résultat sur des femmes contre-faites n'auroit pas été tout à fait le même; car les tubérosités des os pubis, en s'éloignant l'une de l'autre doivent s'écarter d'autant plus du milieu de la Saillie du Sacrum que le Bassin est plus resserré de devant en arrière; ^{quoiqu'il} cela soit vrai, mais on ne peut raisonnablement en conclure en faveur de la Section du Pubis, la différence étant au plus de quelques lignes, et cette opération conviendra toujours d'autant moins que l'épaisseur de la tête de l'enfant excédera davantage la longueur du Petit Diamètre du Bassin. ajoutez à cela qu'un degré d'obliquité entre les os Pubis dans ces sortes de femmes produira des Plus grands Dérègles dans les Symphises Postérieures, ce qui augmentera nécessairement la somme des accidens annexés à cette opération.

S. LXII.

S'il est bien certain qu'on ne puisse faire la Section du Pubis une méthode universelle et également salutaire pour tous les cas où la mauvaise conformation du Bassin s'oppose à l'accouchement, doit-on la rejeter entièrement? et le résultat des expériences dont nous venons de parler n'annonce-t-il pas quelle pourroit être utile au moins dans quelques uns? Je pourrois le penser sans faire le détail de ce que j'ai soutenu publiquement contre cette méthode; puis que je me suis borné à prouver son inutilité, d'après un seul ponce d'écartement, lors que le Détoit Supérieur est resserré au même point, que celui des femmes qui ont fait le sujet des observations de M^{me} Soumain, la Roche, et Milleb^e. Qu'il y ait des hommes ne doivent pas tenir à leur opinion quand elle peut être contraire au salut de quelqu'un plus.

S. LXIII.

Si on connoissoit d'après une expérience suivie les accidens qui peuvent résulter de la déchirure des Symphises Sacro-iliques, il seroit aisé de fixer les cas où cette nouvelle opération pourroit convenir, car il est bien certain qu'elle peut dans plusieurs, rendre le Bassin trop serré, perméable au fœtus. on ne peut alors lui objecter que les accidens dont il s'agit. ~~S'il~~ ~~dans~~ ~~ni~~ ~~jamais~~ ~~plus~~ ~~qu'un~~ ~~pas~~

(*) Le plus grand de ces bassins avoit quatre pouces neuf lignes de Petit Diamètre dans le Détoit Supérieur et le plus resserré trois pouces et un quart seulement.
* note que j'en ai cité l'exemple de M^{me} Milleb^e qui d'après l'observation qu'il m'a faite à l'académie. figurait

qu'elle ne ~~laisse~~ chez la femme Souchee, La Section du Pubis conviendrait toutes les fois
 que le Bassin seroit transversalement trop restreint, ~~et~~ dans la Partie Supérieure ~~ou~~
 ou dans l'inférieure, ^{Sete} à l'occasion ^{+ Data mauvaise disposition des os mêmes, soit par des excroissances} ~~de~~ comme dans la femme qui a le chirurgien de
 crepi en valois fit l'opération césarienne, ~~ou autrement~~. Elle pourroit convenir encore lors
 que le détroit Supérieur, applati de devant en arrière, Présenteroit de la Deduc Pousser en
 demi de Petit diamètre; Puis être me dira-t-on ^{merite} que le force, dans ce dernier cas, ~~en~~
 Supérieure. S'il ne s'agissoit que d'extraire l'enfant, j'en conviendrais; mais Rien n'est Plus incertain
 que l'avis en se servant d'un Pareil moyen, ce Jedoute qu'on puisse enlitter un Seul
 qui ait été Sauvé Par cette méthode ou qui y ait Survécu longtems. D'après Je Puis
 d'observer que Je ne propose, ni que Je ne rejette la Section du Pubis, dans les Circonstances
 que Je viens d'exposer. J'y a beaucoup de chose à faire Pour confirmer les avantages
 qu'on lui ^{Plutôt} attribues, ~~plutôt~~ que reconnus. Mes vœux Se bornent à souhaiter
 qu'on fasse des nouvelles expériences qui Puisse répandre plus de jour Sur ~~ce~~ objet
 afin que Personne ne soit victime d'une Méthode tant Préconisée, si elle est mauvaise,
 ou ne soit privé d'un Qu'elle peut Produire, si elle merite les louanges qu'on lui
 achantes. ~~mais~~ ce n'est ni Sur les animaux ^{ni sur l'espèce} qu'il faudroit faire ces nouvelles
 recherches, Ce seroit Sur des femmes vivantes condamnées à mort. Comme on la
 proposé, dit on, depuis quelques tems, en assurant à le pris d'un certain nombre
 de ces Malheureuses, on épargneroit le sang d'un ~~très~~ ^{plus} grand nombre de Mères
 et d'enfants.

S. LXIV.

Quelques exemples d'enfants nés avant terme, qui ont vécu aussi longtems
 que les autres, ont fait croire que l'accouchement prématuré seroit ~~un~~ utile chez
 les femmes contrefaites, dont le Bassin est vicié au point de ne pouvoir donner issue
 à celui de neuf mois et d'un volume ordinaire. Cette Méthode N'est autorisée Par
 aucune loi: personne ne la encore recommande ~~Par les écrits~~, au moins à Malouinoff
 mais un médecin qui a longtems Professi l'art d'accoucher la recommande dans les
 cours. avant de l'admettre ou de la rejeter il faut examiner s'il y a de la Partie entée
 l'accouchement qui se fait naturellement à un terme donné de la grossesse et celui
 qui est sollicité Par l'art. Mais Pour cela il seroit nécessaire d'expliquer le
 mécanisme de l'un et de l'autre; ce qui excéderoit beaucoup les bornes d'un mémoire
 déjà trop long. Nous ~~ne~~ ferons observer seulement que la différence qu'il y a entre ces
 deux espèces d'accouchemens est d'autant plus grande que la grossesse est plus éloignée de
 son terme Naturel. à Sept mois, Par exemple, l'accouchement sollicité Par l'art
 est toujours très long, très pénible et très laborieux, Parce que le col de la matrice a
 encore Presque toute sa longueur naturelle, que ses fibres, à peine préparées au développe-
 ment, offrent beaucoup de résistance, et que les orifices ne Peuvent s'ouvrir suffisamment
 qu'avec beaucoup de difficulté. Comme l'on excite les contractions de ce viscère qui
 par une irritation mécanique, celle-ci venant à Manquer ces contractions Se relâchent
 et discontinuent peu de tems après. Si on ouvre les membranes, ~~ou~~ si elles se déchirent
 Spontanément, avant que l'orifice ne soit assez ouvert Pour le Passage de l'enfant
 celui-ci, bientôt privé d'air, qui le protégeoit, en quelques sorte, contre l'action
 trop forte de l'organe qui le enferme, y sera comprimé si étroitement, qu'il Perira
 souvent avant qu'il ait pu se frayer une voie assez large Pour en sortir.

L'accouchement



S. LXV

[illegible]

\$ LXVI.

Nous Pensons qu'il est inutile de faire mention ici d'un régime qu'on a recommandé de faire observer aux femmes grosses pour le bassein et vicie, dans les vues de braver l'accroissement ou le volume de l'enfant qu'elles nourrissent dans leur sein. L'expérience journaliere prouve^{que} ce dernier n'est pas toujours en raison de la quantité ni de la nature des aliments que prend la mere. On voit des femmes valetudinaires, mangeant et buvant peu, rejeter d'ailleurs tous ce qu'elles prenoient, depuis pour ainsi dire l'époque de la conception jusqu'à l'augmentation de l'accroissement, et avoir malgré cela un enfant très fort et très vigoureux.

qu'on ne les ait chez la femme soumise, la situation du Pubis conviendrait toutes les fois que le Bassin seroit transversalement trop serré, soit dans l'apertie supérieure, soit dans l'inférieure, à l'occasion de la mauvaise disposition des os innommés ou des exostoses, comme dans la femme qui fait le sujet d'une des observations du chirurgien de corps en Valois sur l'opération césarienne; elle conviendrait encore quand le détroit supérieur, applati de devant en arrière, présenteroit au-delà de deux pouces et demi de largeur, peut être même dire l'ord que le forceps dans ces cas mérite la préférence. S'il ne s'agissoit que d'extraire l'enfant, j'en conviendrais et je ne formerois nul doute à ce sujet. Mais rien n'est plus incertain que l'avis en se servant d'un pareil moyen quand le périspermé de ce détroit n'a que trois pouces moins un quart, par exemple, et je ne croirois pas qu'on puisse en être un seul qu'on ait amené vivant par cette méthode et qui y ait survécu longtemps. Car j'ai vu observer que je ne propose ni que je ne rejette la section du Pubis dans ces circonstances exposées. Il y a beaucoup de chose à faire pour confirmer les avantages qu'on lui a plutôt attribués que reconnus. mes vœux se bornent à souhaiter que l'on fasse des nouvelles expériences qui puissent répandre plus de jour sur cet objet afin que personne ne soit victime d'une opération tant préconisée, si elle est mauvaise, ou ne soit privé d'un bien que peut produire si elle méritoit les louanges qu'on lui a données. Mais ce n'est ni sur le cadavre ni sur les animaux qu'il faudroit faire ces expériences, ce seroit sur des femmes condamnées à mort comme on l'a déjà proposé depuis quelques temps. Il ne s'agit plus de chercher à quel point on peut éloigner les os pubis, ni de fixer les idées sur la réunion de leur symphyse divisée; on sait à quoi s'en tenir sur ces deux points. Il faut passer des effets qui se passent, dans ces cas, de l'écoulement du sang des symphises sacro-iliaques, sur la femme vivante, et des accidents qui doivent en être la suite. en assurant à ce propos l'avis d'un certain nombre de criminelles, si quelques médecins ou chirurgiens osent tremper les mains dans leur sang, on épargneroit celui d'un bien plus grand nombre de mères et d'enfants, signes de la plus grande considération.

Quelques exemples d'enfants nés avant terme qui sont parvenus à un âge très avancé, ont fait croire que l'accouchement prématuré seroit utile chez les femmes ~~et que~~ que la mauvaise conformation du bassin met dans l'impossibilité d'accoucher heureusement au terme d'enfant. Cette méthode, sous l'abus seroit des plus dangereux, n'est autorisée par aucune loi, et personne, au moins à ma connaissance, ne la recommande dans ses écrits. un médecin philosophe qui a long temps professé l'art d'accoucher, la préconisoit fort on dans ses écrits et se flattoit l'avoir mise en pratique dans des cas, ou tout autre ^{seroit au contraire} ~~seroit au contraire~~ ^{il y a voit pensé}, ce précepte, conservé par un de ses disciples, se trouve consigné dans une thèse, dédiée à un ministre qui a long temps surveillé la pureté des mœurs, et à la surveillance publique. elle a été soutenue aux écoles de Montpellier le 27 juillet 1776 par M. Chandon élève de M. Alphonse Lenoir sous le titre *an in utero omni partu, praequantio vitam servare possit obstetricum expertus?* avant d'admettre



ou de condamner une Parvité naturelle, il faut examiner s'il y a de la Parvité entre
l'accouchement qui se fait naturellement à un terme donné de la grossesse, et celui qui
seroit sollicité par art. mais comme il seroit nécessaire pour cela, d'expliquer
le mécanisme de l'une et de l'autre espèce, ce qui excéderoit beaucoup les bornes d'un
memoire déjà trop long, nous ferons observer seulement que la différence qu'il y a
entre le terme naturel à sept mois, par exemple, et l'accouchement sollicité par l'art
sera toujours très long, très pénible et très laborieux; parce que le col de la Matrice
a encore presque toute sa longueur naturelle, que ses fibres, à peine préparées
au développement, offrent beaucoup de résistance que les orifices ne puissent
s'ouvrir qu'avec une extrême difficulté. Comme l'on ne peut ~~les ouvrir~~ ^{les dilater}
la contraction des viscères que par une irritation mécanique, celle-ci venant
à cesser, l'autre ne tardera pas à diminuer et à en faire autant. Si on ouvre
les membranes pour donner issue aux eaux, ou si l'on se remporte deshivert
spontanément avant que l'orifice ne soit assez ouvert, l'enfant, ~~liant~~ ^{liant} privé
du fluide qui le protégeoit en quelque sorte contre l'action trop forte de l'organe
qui le contient, y sera bientôt comprimé si étroitement qu'il y périra avant
qu'il ait pu se frayer une route suffisante pour en sortir. Peut-être objectera-t-on
qu'il seroit aisé de prévenir ces obstacles, en relâchant le col de la matrice
par le moyen des bains, des injections mucilagineuses &c. j'ai vu beaucoup d'enfants
naître vivants à terme, et ~~passés~~ ^{passés} d'intérieur dans des circonstances, qui ~~paraissent~~ ^{paraissent}
devoir faire regarder à certains égards l'accouchement comme très naturel, aucun
de ces enfants n'a survécu longtemps à sa naissance. On se conclut qu'il y a trop
peu à compter sur la viabilité de l'enfant à terme de sept mois, pour chercher à exciter
sa sortie; d'ailleurs elle est toujours tellement à craindre pour la mère, quand des
causes accidentelles la déterminent qu'on ne doit la solliciter que dans un cas extrême
où la vie des deux est en danger. Comme dans le cas d'hémorrhagie considérable
à l'occasion de la présence du Placenta sur l'orifice de la Matrice. à huit mois
je n'aurois peut-être un peu moins d'inconvénient pour l'un et pour l'autre; l'enfant
seroit beaucoup plus fort; pourroit naître avec des meilleures espérances. Mais
si on admettoit l'accouchement prématuré, dans les circonstances qui sont le sujet
de notre memoire ce seroit bien ~~plus~~ ^{moins} le terme de la grossesse ^{où l'enfant est viable} qu'il faudroit
consulter pour fixer l'époque, ~~de~~ ^{de} que le degré d'étroitesse du Bassin: car elle est
quelques fois telle, que la sortie d'un enfant de huit mois même de sept, seroit
tout aussi impossible que celle d'un enfant de neuf. Si on ne vouloit qu'épargner
à la mère une opération dangereuse qu'on a faite jusqu'ici, il faudroit donc la
delivrer plutôt ou plus tard selon la largeur du Bassin: ce seroit seulement à la fin
septième mois si on concevoit quelques espérances du côté de l'enfant. mais alors
cette méthode ne seroit salutaire que dans les femmes dont le Bassin auroit au
moins deux pouces et demi de petit diamètre. Dans les Bassins dont j'ai parlé au
paragraphe XIII l'accouchement n'auroit pu se faire avant le sixième mois
qu'ils n'offroient qu'un pouce de petit diamètre. une femme, que l'amaigrissement
conformait au Bassin avoit déjà mis deux fois dans l'impossibilité d'accoucher
seule, et que j'avois delivrée au moyen du forceps d'un enfant mort, fit une fausse
crosse sur la fin du huitième mois de sa 3^e grossesse. celui donna lieu à la rupture
des membranes et à l'écoulement des eaux: les douleurs se firent sentir que douze
ou quatorze heures après, elles augmentèrent insensiblement, et ne diminuèrent très fortes
que le lendemain. Je serois que l'enfant sortiroit sans autres secours et par la nature
la circonstance

la circonstance qui avoit déterminé ce travail comme des plus heureux. mais malgré l'insistance du travail, l'enfant pendant l'espace d'environ douze heures, la tête ne s'engagea nullement dans le bassin de sorte que j'ai été obligé de l'aller chercher au-dessus du détroit supérieur avec les forceps. L'enfant n'ait pas un sort plus heureux que les premiers et ne nous donna aucun signe de vie. Cette observation prouve que l'accouchement artificiel de huit mois peut offrir les mêmes difficultés qu'au terme le plus naturel.

Nous pensons qu'il est inutile de faire mention du régime qu'on a recommandé de faire observer aux femmes grosses dont le bassin est vicieux dans les vues de borner l'accroissement et de prévenir le volume de l'enfant et qu'elles renferment dans leur sein. L'expérience journalière prouve que ce dernier n'est pas toujours en raison de la nature et de la quantité d'aliments que prend la mère; on a vu des femmes de petite taille manger et buvant peu rejeter d'ailleurs par le vomissement la plus grande partie de ce qu'elles prenoient depuis l'époque de la conception jusqu'à celle de l'accouchement, et avoir malgré cela des enfans bien forts et bien nourris. tandis que d'autres qui avoient à peine rencontré assez d'aliments pour satisfaire à l'activité de leur appétit en ont donné de très petits.

fin
Dre



[Faint, illegible handwriting throughout the page]